




ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

ПАЦИЕНТЫ С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ



1

Спутник V безопасен и рекомендован без ограничений:



онкопациентам, длительно
получающим курсы
циклического лечения,
но не имеющим признаков
гематологической токсичности
(лимфопении, нейтропении,
лекойлении)



онкопациентам,
завершившим
противоопухолевое
лечение

*включая гормональную терапию: такое лечение обычно
не вызывает значимых побочных эффектов и не влияет
на показатели крови



2

Возможны временные противопоказания у пациентов с заболеваниями крови:

- период проведения индукционной и консолидирующей химиотерапии, в том числе период гранулоцитопении;
- период проведения и срок менее 4-х недель после иммунотерапии, в том числе анти-В-клеточной и/или анти-Т-клеточной;
- срок менее 3 месяцев, а в некоторых случаях до 6 месяцев, после выполнения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток/костного мозга, а также при развитии реакции «трансплантат против хозяина» тяжелой степени или в случае неприживления/отторжения трансплантата.



3

Пациенты, перенесшие противоопухолевое лечение,

находятся в группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19. Это делает своевременную вакцинацию особенно важной в этой группе.



Однако это не отменяет уже присутствующих в инструкции противопоказаний, в первую очередь – индивидуальной непереносимости компонентов вакцины.



4

При онкогематологических заболеваниях вакцинация рекомендована до начала лечения, либо в процессе лечения при достижении стабильного уровня лимфоцитов.

Это связано с тем, что онкогематологические пациенты находятся в группе наиболее высокого риска развития респираторных бактериальных и вирусных инфекций, в том числе и SARS-CoV-2.



5

Если запланировано хирургическое вмешательство:



Вакцинация рекомендована за 14 дней или ранее



Либо после выписки из стационара

Предпосылки для повышения риска постvakцинальных реакций у пациентов, получающих противоопухолевое лечение, отсутствуют, поскольку ни одна из российских вакцин не содержит живой вирус.

У пациентов со скомпрометированной иммунной системой эффективность вакцинации может быть снижена (по аналогии с вакциной против гриппа).



6

Вакцинация Спутником V пациентов, получающих потенциально имеющее гематологическую токсичность противоопухолевое лечение (большинство случаев химиотерапии, лучевой терапии) рекомендуется:

- за 2 недели и ранее до начала противоопухолевого лечения;
- в интервалы между курсами химиотерапии;
- до начала курса лучевой терапии;
- после завершения курса лучевой терапии.

